

# السل (الدرن)

## معالجة السعال في الصيدلية


# 4.1

مليون

شخص مصاب بالسل

على مستوى العالم

لم يتم تشخيصهم



الصيدلة هم نقطة الاتصال الأولى الشائعة مع المرضى ولديهم دور مهم في معالجة هذا الأمر.

### الأعراض الشائعة الأخرى للسل النشط



ارتفاع درجة الحرارة



فقدان وزن




السعال مع وجود الدم



فقدان شهية



التعرق الليلي



الارهاق




افعل



اطلب من جميع الأشخاص الذين يعانون من السعال الإبلاغ عن مدة السعال وأي أعراض أخرى.



ضع في اعتبارك احتمالية الإصابة بالسل إذا استمر السعال لمدة أسبوعين أو أكثر.



حوّل الأشخاص الذين يعانون من الأعراض إلى أقرب مرفق صحي أو مزود خاص مؤهل لإجراء اختبارات السل.




لا تفعل

لا تصرف

المضادات الحيوية مثل الفلوروكوينولونات (على سبيل المثال، سيبروفلوكساسين، ليفوفلوكساسين) أو الستيرويدات (على سبيل المثال، ديكساميثازون، بينامتازون) بدون وصفة طبية صالحة.

لا تصرف

أدوية مضادة للسل مثل الريفامبيسين، والإيثامبوتول، والإيزونيازيد، والبيرازيناميد بدون وصفة طبية صالحة.



### تخفيف الأعراض



يمكن صرف الأدوية التي تُباع دون وصفة طبية مثل الباراسيتامول وأدوية السعال (باستثناء مثبطات السعال التي يمكن أن تخفي الأعراض ويجب تجنبها).



Supported by



ADVANCING PHARMACY WORLDWIDE