

TUBERCULOSE

Prise en charge de la toux en pharmacie

Autres symptômes courants de la Tuberculose active



Fièvre



Perte de poids



Toux sanglante



Perte de l'appétit



Sueurs nocturnes



Fatigue



À FAIRE



Interroger toutes les personnes qui toussent sur la durée de la toux et les symptômes associés.



Envisager la Tuberculose si la toux persiste pendant **deux semaines ou plus**.



Adressez ces patients à l'établissement de santé le plus proche ou à un prestataire privé qualifié pour un dépistage de la Tuberculose.



À NE PAS FAIRE

NE PAS DÉLIVRER

d'antibiotiques tels que les fluoroquinolones (ex. ciprofloxacine, lévofloxacine) ou des corticostéroïdes (ex. dexaméthasone, bétaméthasone) sans ordonnance conforme.

NE PAS DÉLIVRER

de médicaments antituberculeux tels que la rifampicine, l'éthambutol, l'isoniazide et le pyrazinamide sans ordonnance conforme.



Soulagement des symptômes

Il est possible de délivrer des médicaments en vente libre tels que le paracétamol et les produits contre la toux (à l'exception des antitussifs, qui peuvent masquer les symptômes et doivent être évités).

4.1 MILLIONS

PERSONNES ATTEINTES DE LA TUBERCULOSE DANS LE MONDE NE SONT PAS DIAGNOSTIQUÉES



Les pharmaciens sont souvent le premier point de contact et ont un rôle important à jouer dans la détection de ces cas.



Supported by

