

ટ્યુબરક્યુલોસિસ

ફાર્મસીમાં ઉધરસનું સંચાલન

સક્રિય ટ્યુબર ક્યુલોસિસ
(ટી.બી.) ના
અન્ય સામાન્ય લક્ષણો



તાવ



વજનમાં ઘટાડો



ખાંસી માં
લોહી



ભૂખ
ન લાગવી



રાત્રે પરસેવો



થાક



હા



ખાંસીવાળા બધા લોકોને
કફની અવધિ અને અન્ય
લક્ષણો વિશે પૂછો



જો ઉધરસ ૨
અઠવાડિયા કે તેથી વધુ
સમય સુધી ચાલુ રહે તો
ટીબીને ધ્યાનમાં લો



આ લોકોને નજીકના
આરોગ્ય કેન્દ્ર અથવા
ખાનગી ડૉ. પાસે
ટીબી પરીક્ષણ માટે
જવાની સલાહ આપો



ના

માન્ય પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના
વેચાણ કરશો નહીં
એન્ટિબાયોટિક્સ જેમ કે
ફ્લોરોકિવનોલોન્સ (દા.ત.
સિપ્રોફ્લોક્સાસીન, લેવોફ્લોક્સાસીન)
અથવા સ્ટેરોઈડ્સ (દા.ત.
કેક્સામેથાસોન, બીટામેથાસોન)

માન્ય પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના,
વેચાણ કરશો નહીં
ટીબી વિરોધી દવાઓ જેમ કે
રિફામ્પિસિન, ઈથામ્બુટોલ,
આઈસોનિયાઝિડ,
પાયરાઝીનામાઈડ



લાક્ષણિક રાહત

પેરાસીટામોલ અને ઉધરસ ઉત્પાદનો (ઉધરસને દબાવતી દવાઓ સિવાય,
કારણ કે તે લક્ષણોને છુપાવી શકે છે અને ટાળવી જોઈએ) જેવી
ઓવર-ઘ-કાઉન્ટર દવાઓનું વિતરણ કરવું ઠીક છે.

4.1

મિલિયન

ટીબીવાળા લોકો

વિશ્વમાં ગુમ થયેલ છે



ફાર્માસિસ્ટ એ એક સહિયારો
બિંદુ છું અને આને સંબોધવમાં
તેમની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા છે.

