

ಕ್ಷಯರೋಗ

ಔಷಧಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಷಯರೋಗದ (ಟಿಬಿ)
ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು



ಜ್ವರ



ತೂಕ ಇಳಿಕೆ




ಕೆಮ್ಮುವುದು
ಅಪ್ ರಕ್ತ



ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ



ರಾತ್ರಿ ಬೆವರುವಿಕೆ



ಆಯಾಸ



ಮಾಡು



ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇತರ
ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮ್ಮು ಹೊಂದಿರುವ
ಜನರನ್ನು ಕೇಳಿ.



ಕೆಮ್ಮು 2 ವಾರಗಳು
ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ
ಟಿಬಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ .



ಟಿಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಈ
ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ
ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ
ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಖಾಸಗಿ
ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.



ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಡ

ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಫ್ಲೋರೋಕ್ವಿನೋಲೋನ್‌ಗಳಂತಹ
ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು (ಉದಾ
ಸಿಫ್ರೋಫ್ಲೋಕ್ಸಾಸಿನ್, ಲೆವೊಫ್ಲೋಕ್ಸಾಸಿನ್)
ಅಥವಾ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್‌ಗಳು (ಉದಾ
ಡೆಕ್ಸಾಮೆಥಾಸಾನ್, ಬೆಟಾಮೆಥಾಸಾನ್)
ಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲದೆ.

ವಿತರಿಸಬೇಡಿ
ಟಿಬಿ ವಿರೋಧಿ ಔಷಧಿಗಳಾದ
ರಿಫಾಂಪಿಸಿನ್,
ಎಥಾಂಬುಟಾಲ್,
ಐಸೋನಿಯಾಜಿಡ್,
ಪಿರಾಜಿನಮೈಡ್ ಮಾನ್ಯವಾದ
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲದೆ.



ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ

ಪ್ಯಾರಿಸಿಟಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಸರಿ
(ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತವೆ ಮತ್ತು
ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು).


4.1

ದಶಲಕ್ಷ

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟಿಬಿ

ಹೊಂದಿರುವ

ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ



ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸಂಪರ್ಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮೊದಲ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.



Supported by



ADVANCING
PHARMACY
WORLDWIDE