

क्षयरोग

फार्मसीमध्ये खोकल्याचे व्यवस्थापन करताना...

सक्रिय क्षयरोगाची (टीबी)
इतर लक्षणे



ताप



वजन कमी होणे




खोकल्यात रक्त



भूक न लागणे



रात्री घाम येणे



थकवा



करा



खोकला असलेल्या सर्व व्यक्तींना खोकल्याचा कालावधी आणि इतर लक्षणांबद्दल विचारा.



खोकला 2 आठवडे किंवा त्याहून अधिक काळ टिकून राहिल्यास टीबी असू शकतो, असे समजा.



अशा व्यक्तींना टीबी चाचणीसाठी जवळच्या आरोग्य सुविधा केंद्रावर किंवा पात्र खाजगी प्रदात्यांकडे पाठवा.



करू नका

फ्लोरोक्विनोलॉन्स (उदा. सिप्रोफ्लोक्सासिन, लेव्होफ्लोक्सासिन) सारखी प्रतिजैविके किंवा स्टिरोइड्स (उदा. डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन) वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय वितरित करू नका.

टीबीविरोधी औषधे, जसे रिफॅम्पिसिन, एथाम्बुटोल, आयसोनियाझिड, पायराझिनामाइड ही वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय वितरित करू नका.




लक्षणांपासून आराम

पॅरासिटामॉल आणि खोकल्यासाठीची उत्पादने यांच्यासारखी ओटीसी औषधे प्रिस्क्रिप्शनशिवाय वितरित करणे ठीक आहे. (खोकला शमन करणारी / दाबून टाकणारी औषधे यातून वगळावीत, कारण ती लक्षणे लपवू शकतात आणि हे टाळले पाहिजे.)

४.१

दशलक्ष

जगभर, इतक्या संख्येने टीबी संक्रामित व्यक्ती नोंदीतून गायब आहेत



यासाठी, फार्मासिस्ट हे सामान्यतः प्रथम संपर्कबिंदू आहेत आणि याविषयावर संवाद साधण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे.



Supported by

