

TUBERCULOSE

Gerenciamento da tosse na farmácia

Outros sintomas comuns da tuberculose (TB) ativa



Febre



Perda de peso




Tosse com sangue



Perda de apetite



Suores noturnos



Fadiga


SIM



Pergunte a todas as pessoas com tosse sobre a duração da tosse e outros sintomas.



Considere a possibilidade de TB se a tosse persistir por **duas semanas ou mais**.




Encaminhe essas pessoas à unidade de saúde mais próxima ou a um provedor privado qualificado para fazer o teste de TB.


NÃO

NÃO DISPENSAR antibióticos como fluoroquinolonas (por exemplo, ciprofloxacina, levofloxacina) ou esteroides (por exemplo, dexametasona, betametasona) sem uma prescrição válida.

NÃO DISPENSAR medicamentos anti-TB, como rifampicina, etambutol, isoniazida e pirazinamida, sem uma prescrição válida.




Alívio sintomático

É possível dispensar medicamentos de venda livre, como paracetamol e produtos para tosse (exceto supressores da tosse, pois eles podem mascarar os sintomas e devem ser evitados).

4.1 MILHÕES

DE PESSOAS COM TUBERCULOSE NÃO ESTÃO DIAGNOSTICADAS MUNDIALMENTE



Os farmacêuticos são um primeiro ponto de contato e têm um papel importante na solução deste problema.



Supported by

