

# क्षयरोग

## फार्मसी में खाँसी का प्रबंधन

सक्रिय क्षयरोग (टीबी) के अन्य सामान्य लक्षण



बुखार



वजन घटना




खाँसी में खून निकलना



भूख न लगना



रात में पसीना



थकान


✓  
करना



खाँसी से पीड़ित सभी व्यक्तियों से खाँसी की अवधि तथा अन्य लक्षणों के बारे में पूछें।



यदि खाँसी 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक बनी रहे तो टीबी समझें।




इन व्यक्तियों को टीबी परीक्षण के लिए निकटतम स्वास्थ्य सुविधा या उचित निजी प्रदाता के पास भेजें।

✗  
नहीं

वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना फ्लोरोक्विनोलोन (जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन) जैसे एंटीबायोटिक्स का या स्टेरॉइड्स (जैसे डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन) का वितरण न करें।

बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के टीबी विरोधी दवाइयों, जैसे रिफैम्पिसिन, एथमब्युटोल, आइसोनियाज़िड, पाइराज़िनामाइड का वितरण न करें।



## रोग की लक्षणों से राहत




पेरासिटामोल और खाँसी के उत्पादों जैसी ओवर-द-काउंटर दवाइयों देना ठीक है (खाँसी दबाने वाली दवाइयों को छोड़कर, क्योंकि वे लक्षणों को छिपा सकती हैं और यह टालना होगा)।

# 41

## लाख

टीबी से पीड़ित लोग विश्व स्तर पर रिकार्ड से गायब हैं



इनके लिए सामान्यतः फार्मासिस्ट ही संपर्क का पहला बिंदु हैं और इस विषय पर वार्तालाप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।



Supported by

