

क्षयरोग

फार्मासेंट खोकलीचें व्यवस्थापन

सक्रिय क्षयरोगाची (टीबी) हेर सामान्य लक्षणां



जोर



वजन देंवप




खोकलेंतल्यान रगत येवप



भूक ना लागप



रातचो घाम येवप



थकवो

✓
करचें



खोकली आशिल्ल्या सगल्या व्यक्तींक खोकलेचो तेंप आनी हेर लक्षणांविशीं विचारात.




खोकली 2 आठवडे / सप्तकां वा ताचेपरस चड तेंप तिगून उरल्यार टीबी आसूंक शकता, अशें समजुचें .



अशे व्यक्तींक टीबी चांचणी खातीर लागींच्या भलायकी सुविधा केंद्राचेर वा पात्र खाजगी प्रदात्यांकडेन धाडचें.

✗
न्हय

फ्लोरोक्विनोलॉन्स (उदा. सिप्रोफ्लोक्सासिन, लेव्होफ्लोक्सासिन) सारकी प्रतिजैविकां वा स्टेस्ट्रॉइड्स (उदा. डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन) वैध प्रिस्क्रिप्शना बगर वितरीत करूं नाकात.



टीबीविरोधी वखदां, जशें रिफॅम्पिसिन, एथाम्बुटोल, आयसोनियाझिड, पायराझिनामाइड ही वैध प्रिस्क्रिप्शना बगर वितरीत करूं नाकात.




लक्षणांपसून थाकाय

पॅरासिटामॉल आनी खोकले खातीर आशिल्लीं उत्पादनां हांचेसारकी ओटीसी वखदां प्रिस्क्रिप्शना बगर वितरीत करप समा जातलें. (सोडून खोकलीचें शमन करपी / दामून उडोवपी वखदां, कारण तीं लक्षणां लिपोवंक शकतात आनी हें समा न्हय, तें टाळचें.)

४२ लाख

संवसारभरांतल्यान, इतल्यो टीबी संक्रामीत व्यक्ती नोंदींतल्यान बेपत्ता आसात



हाचे खातीर, भोवतेक करून फार्मासिस्ट हे पयले संपर्कबिंदू आसात आनी ह्या विषयाचेर वर संवाद साधपांत तांची भुमिका म्हत्त्वपूर्ण आसा.



Supported by

