

காசநோய்

மருந்தகத்தில் இருமலை நிர்வகித்தல்

செயலில் உள்ள
காசநோயின் (TB) மற்ற
பொதுவான அறிகுறிகள்



காய்ச்சல்



எடை இழப்பு




இருமலுடன்
கலந்த இரத்தம்



பசியின்மை



இரவு
வியர்த்தல்



உடல்
சோர்வு




செய்யவேண்டியவை செய்யக்கூடாதவை




இருமல் மற்றும் பிற
அறிகுறிகளின் காலம்
பற்றி இருமல் உள்ள
அனைவரிடமும்
கேளுங்கள்.



இருமல் 2 வாரங்கள்
அல்லது அதற்கு மேல்
நீடித்தால் காசநோயைக்
கவனியுங்கள் .



காசநோய்
பரிசோதனைக்காக
இவர்களை அருகில்
உள்ள சுகாதார
வசதி அல்லது
தகுதிவாய்ந்த
தனியார்
வழங்குநரிடம்
பரிந்துரைக்கவும்.



புளுரோகியோலோன்ஸ்
(எ.கா. சிப்ரோஃப்ளோக்சசின்,
லீவோப்ளாக்ஸேசின்) அல்லது
ஸ்டிராயிடோக்சன் (எ.கா.
டெக்ஸாமெதாசோன்,
பீட்டாமெதாசோன்) போன்ற
நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் சரியான
மருந்துச் சீட்டு இல்லாமல்
விநியோகிக்க வேண்டாம்

ரிஃபாம்பிசின், எதம்ப்யூடால்,
ஐசோனியாசிட்,
பைராசினமைடு போன்ற
காசநோய் எதிர்ப்பு
மருந்துகள் சரியான
மருந்துச் சீட்டு இல்லாமல்
விநியோகிக்க வேண்டாம்




அறிகுறி நிவாரணம்

பாராசிட்டமால் மற்றும் இருமல் நிவாரணிகள் போன்ற
மருந்துசீட்டு தேவைப்படாத மருந்துகளை மருந்து
கடைகளில் விநியோகிக்கலாம். (இருமல் அடக்கிகளை
மட்டும் விநியோகிக்கலாமல் தவிர்க்கலாம் ஏனென்றால் அது
முக்கிய அறிகுறியான இருமலை மறைத்துவிடும்)

4.1

மில்லியன்
காசநோய்
உள்ளவர்கள்
உலகளவில்
காணவில்லை



மருந்தாளுநர்கள் , ஒரு
பொதுவான முதல் நிலை
தொடர்பாளர்கள் மற்றும்
இதை நிவர்த்தி செய்வதில்
முக்கிய பங்கு
வகிக்கின்றனர்.



Supported by



ADVANCING
PHARMACY
WORLDWIDE