

ТУБЕРКУЛЕЗ

Лечение кашля в аптеке

Другие распространенные симптомы активного туберкулеза (ТБ)



Лихорадка



Потеря веса



Кашель с кровью



Потеря аппетита



Ночная потливость



Усталость

СТОИТ

-  Расспросить всех людей с кашлем о продолжительности кашля и других симптомах.
-  Рассмотреть возможность туберкулеза, если кашель сохраняется в течение **2 и более недель**.
-  Направить этих людей в ближайшее медицинское учреждение или к квалифицированному частному врачу для тестирования на туберкулез.

НЕ СТОИТ

- НЕ ВЫДАВАТЬ** антибиотики, такие как фторхинолоны (например, ципрофлоксацин, левофлоксацин) или стероиды (например, дексаметазон, бетаметазон) без действительного рецепта.
- НЕ ВЫДАВАТЬ** противотуберкулезные препараты, такие как рифампицин, этамбутол, изониазид, пиразинамид, без действительного рецепта.



Симптоматическое облегчение

Можно отпускать без рецепта такие лекарства, как парацетамол и средства от кашля (кроме подавляющих кашель препаратов, поскольку они могут маскировать симптомы, и их следует избегать).



4.1
МИЛЛИОН
ЛЮДЕЙ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
В МИРЕ
НЕ УЧТЕНА



Фармацевты часто являются первой точкой контакта и играют важную роль в решении этой проблемы.