

TUBERCULOSIS

Control de la tos en la farmacia

Otros síntomas comunes de la tuberculosis activa (TB)

-  Fiebre
-  Pérdida de peso
-  Tos con sangre
-  Pérdida de apetito
-  Sudores nocturnos
-  Fatiga

✓ SÍ

-  Pregunte a todas las personas con tos sobre la duración de la tos y otros síntomas.
-  Considere la tuberculosis si la tos persiste durante **2 semanas o más.**
-  Remita a estas personas al centro de salud más cercano o a un proveedor privado cualificado para que les hagan la prueba de la tuberculosis.

✗ NO

- NO DISPENSAR** antibióticos como fluoroquinolonas (por ejemplo, ciprofloxacino, levofloxacino) o esteroides (por ejemplo, dexametasona, betametasona) sin una receta válida.
- NO DISPENSAR** medicamentos antituberculosos como rifampicina, etambutol, isoniazida, pirazinamida sin una receta válida.





Alivio sintomático

Se pueden dispensar medicamentos sin receta, como paracetamol y productos para la tos (excepto los antitusígenos, ya que pueden enmascarar los síntomas y deben evitarse).

4.1 MILLÓN
PERSONAS CON TUBERCULOSIS NO ESTÁN DIAGNOSTICADAS EN EL MUNDO



Los farmacéuticos suelen ser el primer punto de contacto y desempeñan un papel importante a este respecto.

