


# క్షయవ్యాధి




## ఫార్మసీలో దగ్గును నివారించడం


యాక్టివ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్  
(TB) యొక్క ఇతర  
సాధారణ లక్షణాలు

- జ్వరం
- బరువు నష్టం
- దగ్గు తో పాటు రక్తం
- ఆకలి తగ్గటం
- రాత్రి చెమటలు
- అలసట




### చేయదగినవి

-  దగ్గు ఉన్న వ్యక్తులందరినీ దగ్గు మరియు ఇతర లక్షణాల వ్యవధి గురించి అడగండి.
-  దగ్గు 2 వారాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే TB గా పరిగణించండి .
-  TB పరీక్ష కోసం ఈ వ్యక్తులను సమీప ఆరోగ్య సదుపాయం లేదా అర్హత కలిగిన ప్రైవేట్ ప్రొవైడర్ వద్దకు రిఫర్ చేయండి.



### చేయకూడనివి

- చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రీస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఫ్లూరోక్విలోలోన్స్ (ఉదా సీప్రోఫ్లోక్సాసిన్, లెవోఫ్లోక్సాసిన్) లేదా స్టెరాయిడ్స్ (ఉదా. డెక్సామెథాసోన్, బీటామెథాసోన్) వంటి యాంటీబయాటిక్స్ పంపిణీ చేయవద్దు.
- చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రీస్క్రిప్షన్ లేకుండా రిఫాంపిసిన్, ఇథాంబుటోల్, ఐసోనియాజిడ్, పైరజినామైడ్ వంటి TB వ్యతిరేక మందులు, పంపిణీ చేయవద్దు.




### రోగలక్షణ ఉపశమనం

పారాసెటమాల్ మరియు దగ్గు ఉత్పత్తులు వంటి ఓవర్-ది-కౌంటర్ మందులను పంపిణీ చేయడం సరైంది (దగ్గును అణిచివేసే మందులు మినహా అవి లక్షణాలను మాస్క్ చేయగలిగవు మరియు వాటికి దూరంగా ఉండాలి).

# 4.1

## మిలియన్

TB ఉన్న వ్యక్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తించబడటం లేదు



ఫార్మసీస్ట్లు ఒక సాధారణ మొదటి సంప్రదింపు పాయింట్ మరియు దీనిని పరిష్కరించడంలో ముఖ్యమైన పాత్రను కలిగి ఉంటారు.