

TÜBERKÜLOZ (VEREM)

Eczanede öksürük yönetimi

Aktif Tüberkülozun (TB) diğer yaygın belirtileri



Ateş



Kilo kaybı




Kan tükürme



İştah kaybı



Gece terlemeleri



Yorgunluk


✓
YAP



Öksürüğü olan tüm kişilere öksürüğün süresini ve diğer semptomları sorun.



Öksürük **2 hafta veya daha uzun** süre devam ederse TB düşünün.



Bu kişileri TB testi için en yakın sağlık kuruluşuna veya nitelikli özel sağlayıcıya yönlendirin.

✗
YAPMA

DAĞITMAYIN

geçerli bir reçete olmadan florokinolonlar (örn. siprofloksasin, levofloksasin) veya steroidler (örn. deksametazon, betametazon) gibi antibiyotikler.

DAĞITMAYIN

geçerli bir reçete olmadan rifampisin, etambutol, izoniazid, pirazinamid gibi anti-TB ilaçları.



Semptomatik rahatlama

Parasetamol ve öksürük ürünleri gibi reçetesiz satılan ilaçların verilmesinde sakınca yoktur (semptomları maskeleyebilecekleri ve kaçınılması gerektiği için öksürük kesiciler hariç).



Supported by



4.1
MİLYON
VEREMLİ KİŞİLER
KÜRESEL
OLARAK
KAYIP



Eczacılar yaygın bir ilk temas noktasıdır ve bu konunun ele alınmasında önemli bir role sahiptir.